

Гентовіт™ 10%
(водорозчинний порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Водорозчинний порошок білого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

гентаміцину сульфат - 100 мг.

Допоміжні речовини: глюкоза.

Фармакологічні властивості

Гентаміцин - аміноглікозидний антибіотик. Він діє бактерицидно на грамнегативні і, частково, на грампозитивні бактерії: *Enterobacter aerogenes*, *E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Neisseria spp.*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Shigella spp.*, *Staphylococcus spp.*, окремі *Streptococcus species* і *Proteus species*, *Serpulina (Treponema) hyodysenteriae*, *Mycoplasma spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacillus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocitigenes*.

Гентаміцин проникає до клітини шляхом кисень-залежного активного транспорту та пасивною дифузією. Після чого гентаміцин зв'язується з рецепторами протеїну на рівні 30S рибосомальних субодиниць та блокує формування комплексу, який включає мРНК, формілметіонін та тРНК. В результаті виникає некоректна трансляція тРНК, що призводить до утворення нефункціональних протеїнів.

Застосування

Лікування свиней, телят (віком до 3 місяців), курей-бройлерів, племінних курей, ремонтного молодняка птиці при захворюваннях травного каналу (колібактеріоз, сальмонельоз, дизентерія, кампілобактеріоз), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до гентаміцину.

Дозування

Перорально застосовують з питною водою або з кормом у дозі:

свині - 5 мг гентаміцину сульфату на 1 кг маси тіла (5 г препарату на 100 кг маси тіла) двічі на добу. Тривалість лікування 3-5 діб;

кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк птиці - 5 мг гентаміцину сульфату на 1 кг маси тіла (5 г препарату на 100 кг маси тіла) на добу. Тривалість лікування 5-7 діб;

телята - 5 мг гентаміцину сульфату на 1 кг маси тіла (5 г препарату на 100 кг маси тіла) на добу (розділити на 2 прийоми). Тривалість лікування - 3-5 діб.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до гентаміцину.

Не застосовувати препарат одночасно або послідовно з іншими ото- або нефротоксичними препаратами (стрептоміцином, канаміцином, апраміцином, неоміцином, хлорамфеніколом), а також диуретиками і міорелаксантами.

Не застосовувати великій рогатій худобі з функціонально розвиненими передшлунками та курам-несучкам, яйця від яких призначені для харчування людей.

Застереження

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяється через 10 (телята, свині) та 14 (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк) діб після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Препарат ретельно змішувати з кормом. Рекомендується спочатку змішати його з 3-10 % загальної кількості корму, а потім змішати отриману суміш із кормом, який залишився.

Форма випуску

Полімерні або скляні банки по 500 г та 1000 г, пакети з плівкових чи фольгованих матеріалів по 50 г, 500 г та 1000 г, або паперові мішки по 5 кг, 25 кг.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 0 до 25°C.
Термін придатності – 3 роки. Термін придатності після розведення – 24 години.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ “АТ Біофарм”
61057, м. Харків, пров. Театральний, 5, кв. 1-а
Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ “АТ Біофарм”
61057, м. Харків, пров. Театральний, 5, кв. 1-а
Україна