

Спелімікс™, розчин для ін'єкцій
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий безбарвний розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

лінкоміцин – 50 мг;

спектиноміцин – 100 мг.

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

Лінкоміцин – антибіотик з групи лінкозамідів. Лінкоміцин пригнічує синтез білка в мікроорганізмах, зв'язуючи 50 S рибосомальні субодиниці бактеріальних клітин. Виявляє бактериостатичну або бактерицидну дію залежно від концентрації. Діє переважно на грампозитивні (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium spp.*) та на грамнегативні мікроорганізми (*Actinobacillus spp.*, *Bordetella spp.*, *Nocardis spp.*, *Actinomyces spp.*). Особливо ефективний проти *Serpulina hyodysenteriae* та *Mycoplasma spp.*.

Спектиноміцин – антибіотик трициклічної структури з групи аміноглікозидів. Ефективність дії пов'язана з пригніченням синтезу білків в мікробній клітині, шляхом зв'язання 30S рибосомної субодиниці мікроорганізмів, що попереджує подовження поліпептидного ланцюгу на етапі транслокації. Діє переважно на грамнегативні та грампозитивні мікроорганізми (*E.coli*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella spp.*, *Clostridium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Haemophilus spp.*, *Vibrio spp.*), а також на *Mycoplasma spp.*

Застосування

Лікування великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, собак, котів, свійської птиці (курей-бройлерів, індиків) при захворюваннях травного каналу, органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до лінкоміцину і спектиноміцину.

Дозування

Внутрішньом'язово в області шиї у дозі:

свині - 1 мл препарату на 10 кг маси тіла, 1 раз на добу протягом 3-7 діб;

телята - 1 мл препарату на 10 кг маси тіла, 1 раз на добу протягом 2-4 діб;

вівці, кози - 1 мл препарату на 10 кг маси тіла, 1 раз на добу протягом 3 діб;

собаки, коти - 1 мл препарату на 5 кг маси тіла, 1 раз на добу протягом 3-5 діб (максимально 21 доба).

Підшкірно у дозі:

кури-бройлери, індики - 1 мл препарату на 2,5 кг маси тіла, 1 раз на добу протягом 3 доби.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до лінкоміцину та спектиноміцину.

Не застосовувати коням, а також курам-несучкам, яйця яких призначені для використання в їжу людям.

Препарат не застосовувати одночасно з еритроміцином.

Застереження

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяється, відповідно, через 14 та 7 діб після останнього застосування препарату. Споживання молока в їжу людям дозволяється через 3 доби після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Скляні флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 10, 50 та 100 мл.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15 до 25 °С. Охолодження не потребує.

Термін придатності – 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ “АТ Біофарм”

61057, м. Харків, пров. Театральний, 5, кв. 1-а

Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ “АТ Біофарм”

61057, м. Харків, пров. Театральний, 5, кв. 1-а

Україна