

**Флосан™ 4%**  
**(роздріб для перорального застосування)**  
**листівка-вкладка**

**Опис**

Прозорий в'язкий розчин.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

флуорфенікол – 40 мг.

Допоміжні речовини: ПЕО-400.

**Фармакологічні властивості**

Флуорфенікол – синтетичний антибіотик, похідний тіамфеніколу, з широким спектром дії. Механізм дії пов'язаний з пригніченням активності ферменту пептиділтрансферази мікробної клітини, особливо на ділянці 70 S рибосом. Флуорфенікол ефективний проти *Pasteurella spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Aeromonas salmonicida*, *Campylobacter spp.*, *Edwardsiella ictaluri*, *Edwardsiella tarda*, *Flexibacter spp.*, *Pseudotuberculosis*, *Vibrio spp.*, а також діє на мікоплазми (*Mycoplasma spp.*).

**Застосування**

Свині: лікування тварин, хворих на плевропневмонію, атрофічний риніт, Гласерову хворобу, гемофільоз, мікоплазмоз та інші хвороби, що спричинені мікроорганізмами (*Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus parasuis*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*), чутливими до флуорфеніколу.

Кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк птиці: лікування птиці, хворої на колінфекцію, пастерельоз, мікоплазмоз, а також при захворюваннях органів дихання та травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.

**Дозування**

Перорально застосовують з питною водою у дозі:

свині - 1,5-2 мг флуорфеніколу на 1 кг маси тіла (3,75-5 мл препарату Флосан на 100 кг маси тіла) на добу. Курс лікування - 7 діб.

кури-бройлери, племінна птиця, ремонтний молодняк птиці - 20 мг флуорфеніколу на 1 кг маси тіла (50 мл препарату на 100 кг маси тіла) на добу. Курс лікування 3-5 діб. Через дозатор препарат Флосан задають у нерозведеному вигляді або готують маточний розчин у співвідношенні не менше 20 л води на 1 л препарату.

**Протипоказання**

Не застосовують тваринам, чутливим до флуорфеніколу, а також кнурам, поросним свиноматкам та свиноматкам у період лактації. Не застосовувати курам-несучкам, яйця від яких призначенні у харчування людей.

Не застосовувати одночасно з тіамфеніколом та хлорамфеніколом.

**Застереження**

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяється через 2 доби після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Зміна кольору фекалій, діарея, почервоніння або припухлість періанальної ділянки прямої кишки, які зникають після відміни препарату.

У разі застосування препарату Флосан через дозатор використовують нерозчинений препарат або готують маточний водний розчин у співвідношенні 1:20.

**Форма випуску**

Флакони по 10, 50, 100, 200, 500 та 1000 мл та каністри місткістю по 1, 5, 10, 25, 50 л.

**Зберігання**

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5 до 25 °C.

Продовження додатку 2  
до реєстраційного посвідчення АВ-02035-01-12  
від 13.04.2012 р.

Термін придатності 2 роки. Термін придатності після розведення – 24 години.  
**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення:**

ТОВ “АТ Біофарм”  
61057, м. Харків, пров. Театральний, 5, кв. 1-а  
Україна

**Виробник готового продукту:**

ТОВ “АТ Біофарм”  
61057, м. Харків, пров. Театральний, 5, кв. 1-а  
Україна