

Мадуро® форте
листівка-вкладка

Опис

Порошок для перорального застосування.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини:

амонію мадураміцин 9 мг;

диклазурил 2 мг.

Допоміжні речовини: пшенична крупа.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP51, препарати проти протозойних інфекцій (QP51AX10 мадураміцин, QP51AJ03диклазурил)

Властивості препарату Мадуро® форте зумовлені властивостями діючих речовин амонію мадураміцин і диклазурил.

Мадураміцин – еймеріостатик групи іонофорів, активний щодо еймерій (*E. tenella*, *E. acervulina*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. brunetti*) у стадіях спорозоїтів, трофозоїтів і шизоїтів першої генерації. Механізмом дії препарату ґрунтується на порушенні транспортуванні одновалентних іонів Na⁺ і K⁺ через мембрану клітини паразита з його подальшою загибеллю.

Диклазурил – еймеріостатик групи триазинів, порушує енергетичні обмінні процеси ендогенного розвитку еймерій. Діє на усі види еймерій птиці (*Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. adenoeides*, *E. gallopavonis*, *E. meleagrimitis* та інш.), еймерій кролів (*E. flavescens*, *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. perforans*, *E. stiedai* та інш.), великої рогатої худоби, овець, кіз і свиней. Найбільш чутливі до препарату нестатеві форми ендогенного циклу розвитку еймерій.

Застосування

Лікування та профілактика кокцидіозів курей (курчата бройлери, ремонтний молодняк курей яйценосних кросів) віком до 16 тижнів та індиків до 12 тижнів, спричинених різними видами еймерій.

Дозування

Препарат згодують птиці з кормом у дозі 500 г препарату на 1 т корму (0,5 г препарату на 1 кг корму).

Препарат ретельно перемішують з кормом. Спочатку змішують з невеликою частиною корму (3-10 % загальної кількості), а потім отриману суміш перемішують із рештою корму.

Протипоказання

Підвищена чутливість до мадураміцину та диклазурилу.

Не застосовувати курям-несучкам.

Не застосовувати одночасно з іншими протикокцидійними препаратами.

Забороняється застосування препарату Мадуро форте одночасно з тіамуліном, а також 7 діб до і 7 діб після застосування тіамуліна.

Застереження

Нерівномірне змішування препарату з кормом, нерівномірне поїдання корму, що містить препарат (голодні, хворі тварини), перевищення рекомендованих концентрацій препарату в кормі можуть, в окремих випадках, призводити до зниження продуктивності тварин і навіть до виникнення клінічних ознак отруєння.

Забій птиці на м'ясо дозволяється через 5 діб після останнього застосування препарату.

Форма випуску

Паперові або комбіновані пакети по 0,1; 1,0 кг та мішки по 25 кг.

Зберігання

Зберігати препарат у заводському упакуванні у сухому темному недоступному для дітей та тварин місці за температури від 0 до 30 °С.

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АВ-03993-01-12
від 17.12.2012

Термін придатності – 1 рік.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту:

ТОВ «АТ Біофарм», Україна, 61057, м. Харків, Київський р-н, пров. Театральний, 5, к.1-А