

**Тримаст форте**  
**(розчин для інтрацестерального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Прозорий розчин світло-жовтого кольору зі специфічним запахом.

**Склад**

10 мл препарату містять діючі речовини:

енрофлоксацин - 200 мг,

триметоприм – 100 мг,

преднізолон – 10 мг.

**Фармакологічні властивості**

Енрофлоксацин – антибіотик широкого спектру дії з групи фторхінолонів. Препарат має протимікробну дію відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corinebacterium spp.*, *Pseudomonas*, *E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.* та інші), а також діє на мікоплазми і хламідії. Механізм дії пов'язаний із пригніченням бактеріальної ДНК-гірази, що призводить до порушення реплікації ДНК бактерій. Препарат швидко розповсюджується в органах і тканинах. Терапевтичні концентрації досягаються через 1-1,5 години після введення і зберігаються протягом 24 годин.

Триметоприм – протимікробний засіб широкого спектру дії з групи діамінопіримідинів. Препарат має протимікробну дію відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів (*Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*; *Pasteurella spp.*; *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*; *Shigella spp.*; *Staphylococcus spp.*; *Streptococcus spp.*; *Haemophilus spp.*; *Chlamidia*), а також діє на токсоплазми та кокцидії. Механізм дії пов'язаний із пригніченням бактеріальної редуктази дигідрофолієвої кислоти. Метаболізується у печінці і виділяється, головним чином, нирками шляхом клубочкового фільтрування та активної канальцевої секреції. Концентрація у сечі значно вища, ніж у крові. Період напіввиведення становить 8 – 10 годин.

Преднізолон – синтетичний глюкокортикоїдний препарат, виявляє протизапальну, протиалергічну, імунодепресивну та антипроліферативну дію.

**Застосування**

Для лікування корів при клінічних та субклінічних маститах.

**Дозування**

Після видоювання уражених чвертей молочної залози у сосковий канал вводять вміст однієї шприц-туби (10 мл), підігрітої до температури тіла тварини, двічі на добу. Лікування продовжують до клінічного одужання (1 – 4 доби).

**Протипоказання**

Не застосовувати тваринам, які мають підвищену індивідуальну чутливість до будь-якого з активніючих компонентів препарату, на підставі якої можливе виникнення алергічних реакцій.

**Застереження**

Препарат не призначають у субтерапевтичних дозах та тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

Термін вживання молока в їжу людям встановлено через 3 доби після останнього застосування препарату. До зазначеного терміну молоко згодують непродуктивним тваринам або утилізують (залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини).

**Форма випуску**

Упакування, яке містить 10 полімерних шприц-тубів по 10 мл.

**Зберігання**

Суше, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 10°C до 25°C.

Термін придатності - 2 роки.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:**

ТОВ "АТ Біофарм", 61057, м. Харків, пров. Театральний, 5, кв. 1-а, Україна